

## ANTICONCEPCIONAIS ORAIS DE EMERGÊNCIA

<b>ANTICONCEPCIONAIS ORAIS DE EMERGÊNCIA (AE)</b> (inclusive pílulas anticoncepcionais de levonorgestrel e pílulas anticoncepcionais orais combinadas)	Os AE não protegem contra IST/HIV. Se houver risco de IST/HIV (inclusive durante a gravidez ou após o parto), recomenda-se o uso correcto e consistente de preservativos, tanto isoladamente quanto em combinação com outro método anticoncepcional. Está comprovado que os preservativos masculinos de látex protegem contra IST/HIV.	
<b>SITUAÇÃO</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>ESCLARECIMENTOS/EVIDÊNCIAS</b>
<b>GRAVIDEZ</b>	NA	<b>Esclarecimento:</b> Embora este método não seja indicado para mulheres com suspeita ou confirmação de gravidez, não se conhecem efeitos patogênicos para a mulher no decurso da gravidez nem para o feto caso sejam acidentalmente utilizadas AE durante a gestação.
<b>AMAMENTAÇÃO</b>	1	
<b>GRAVIDEZ ECTÓPICA ANTERIOR</b>	1	
<b>ANTECEDENTES DE COMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES GRAVES*</b> (doença cardíaca isquêmica, acidente vascular cerebral ou outras complicações tromboembólicas)	2	
<b>ANGINA PECTORIS*</b>	2	
<b>ENXAQUECA*</b>	2	
<b>DOENÇA HEPÁTICA GRAVE</b> (inclusive icterícia)*	2	
<b>USO REPETIDO DE AE</b>	1	<b>Esclarecimento:</b> O uso recorrente de AE é uma indicação de que a mulher necessita de maior aconselhamento em relação a outras opções contraceptivas. Frequentemente, o uso repetido de AE poderá ser pernicioso a mulheres que apresentem as condições classificadas como 2, 3 ou 4 para o uso de AOC, AIC ou AP.
<b>ESTUPRO*</b>	1	

### \* Comentários adicionais

#### **ANTECEDENTES DE COMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES GRAVES**

A duração do uso de AE é inferior ao do uso regular de AOC ou PP e, sendo assim, é de se esperar que apresente impacto clínico menor.

#### **ANGINA PECTORIS**

A duração do uso de AE é inferior ao do uso regular de AOC ou PP e, sendo assim, é de se esperar que apresente impacto clínico menor.

#### **ENXAQUECA**

A duração do uso de AE é inferior ao do uso regular de AOC ou PP e, sendo assim, é de se esperar que apresente impacto clínico menor.

**DOENÇA HEPÁTICA GRAVE (inclusive icterícia)**

A duração do uso de AE é inferior ao do uso regular de AOC ou PP e, sendo assim, é de se esperar que apresente impacto clínico menor.

**ESTUPRO**

Não há restrições quanto ao uso de AE em casos de estupro.