

ANTICONCEPCIONAIS ORAIS DE EMERGÊNCIA

ANTICONCEPCIONAIS ORAIS DE EMERGÊNCIA (AE) (inclusive pílulas anticoncepcionais de levonorgestrel e pílulas anticoncepcionais orais combinadas)	Os AE não protegem contra IST/HIV. Se houver risco de IST/HIV (inclusive durante a gravidez ou após o parto), recomenda-se o uso correto e consistente de preservativos, tanto isoladamente quanto em combinação com outro método anticoncepcional. Está comprovado que os preservativos masculinos de látex protegem contra IST/HIV.	
CONDIÇÃO	CATEGORIA	ESCLARECIMENTOS/EVIDÊNCIAS
GRAVIDEZ	NA	Esclarecimento: Embora este método não seja indicado para mulheres com suspeita ou confirmação de gravidez, não se conhecem efeitos patogênicos para a mulher no decurso da gravidez nem para o feto caso sejam acidentalmente utilizadas AE durante a gestação.
AMAMENTAÇÃO	1	
GRAVIDEZ ECTÓPICA ANTERIOR	1	
ANTECEDENTE DE COMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES GRAVES* (doença cardíaca isquêmica, acidente vascular cerebral ou outras condições tromboembólicas)	2	
ANGINA PECTORIS*	2	
ENXAQUECA*	2	
DOENÇA HEPÁTICA GRAVE (inclusive icterícia)*	2	
USO REPETIDO DE AE	1	Esclarecimento: O uso recorrente de AE é uma indicação de que a mulher necessita de maior aconselhamento em relação a outras opções contraceptivas. Frequentemente, o uso repetido de AE poderá ser pernicioso a mulheres que apresentem as condições classificadas como 2, 3 ou 4 para o uso de AOC, AIC ou AP.
ESTUPRO*	1	

* Comentários adicionais

ANTECEDENTE DE COMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES GRAVES

A duração do uso de AE é inferior ao do uso regular de AOC ou PP e, sendo assim, é de se esperar que apresente impacto clínico menor.

ANGINA PECTORIS

A duração do uso de AE é inferior ao do uso regular de AOC ou PP e, sendo assim, é de se esperar que apresente impacto clínico menor.

ENXAQUECA

A duração do uso de AE é inferior ao do uso regular de AOC ou PP e, sendo assim, é de se esperar que apresente impacto clínico menor.

DOENÇA HEPÁTICA GRAVE (inclusive icterícia)

A duração do uso de AE é inferior ao do uso regular de AOC ou PP e, sendo assim, é de se esperar que apresente impacto clínico menor.

ESTUPRO

Não há restrições quanto ao uso de AE em casos de estupro.